

令和7年度 定期予防接種及び接種時期一覧

接種時期（対象）			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
			か	か	か	か	か	か	か	か	か	か	歳	歳	歳	歳	歳	歳	歳	歳	歳	歳	歳	歳		
			月	月	月	月	月	月	月	月	月	月	月	月	月	月	月	月	月	月	月	月	月	月		
生ワクチン	ロタウイルス感染症 (1価ワクチン)	計2回	生後6週～24週まで（標準的には、生後2か月から開始。初回接種は生後14週6日までが望ましい） 27日以上の間隔をあけて2回																							
	ロタウイルス感染症 (5価ワクチン)	計3回	生後6週～32週まで（標準的には、生後2か月から開始。初回接種は生後14週6日までが望ましい） 27日以上の間隔をあけて3回																							
不活化ワクチン	B型肝炎	計3回	1歳未満（標準的には、生後2か月以上9か月未満） 27日以上の間隔をあけて2回 1回目から139日以上の間隔をあけて1回																							
	Hib（ヒブ）感染症 (インフルエンザ菌b型)	計4回	生後2か月以上5歳未満（標準接種開始年齢：生後2か月以上7か月未満） [初回]27日以上の間隔をあけて3回 [追加]初回3回目終了後、7か月以上の間隔をあけて1回 ※生後7か月以上1歳未満で接種を開始する場合 [初回]27日以上の間隔をあけて2回 [追加]初回2回目終了後、7か月以上の間隔をあけて1回 ※1歳以上5歳未満で接種を開始する場合1回																							
	小児用肺炎球菌感染症	計4回	生後2か月以上5歳未満（標準接種開始年齢：生後2か月以上7か月未満） [初回]27日以上の間隔をあけて3回 [追加]初回3回目終了後、1歳以降に60日以上の間隔をあけて1回 ※生後7か月以上1歳未満で接種を開始する場合 [初回]27日以上の間隔をあけて2回 初回2回目終了後、60日以上の間隔をあけて1歳以降に1回 ※1歳以上2歳未満で接種を開始する場合 60日以上の間隔をあけて2回 ※2歳以上5歳未満で接種を開始する場合1回																							
	5種混合 (ジフテリア・百日せき・破傷風・不活化ポリオ・ヒブ)	計4回	生後2か月以上7歳6か月未満 [1期初回]20日以上の間隔をあけて3回 [1期追加]初回3回目終了後、6か月以上の間隔をあけて1回																							
	4種混合 (ジフテリア・百日せき・破傷風・不活化ポリオ)	計4回	生後2か月以上7歳6か月未満 [1期初回]20日以上の間隔をあけて3回 [1期追加]初回3回目終了後、6か月以上の間隔をあけて1回																							
	結核 (BCG)	計1回	1歳未満に1回 (標準接種開始年齢：生後5か月以上8か月未満)																							
生ワクチン	麻疹風疹混合 (MR)	計2回	[1期]1歳以上2歳未満に1回												[2期]小学校入学前の1年間（4月1日～翌年の3月31日）に1回 (H31.4.2～R2.4.1の間に生まれた人が対象)											
	水痘	計2回	1歳以上3歳未満に3か月以上の間隔をあけて2回 (標準接種年齢：1歳以上1歳3か月未満に1回目、その後6か月以上12か月の間隔をあけて2回目)																							
不活化ワクチン	日本脳炎	計4回	[1期]生後6か月以上7歳6か月未満 [1期初回]6日以上の間隔をあけて2回 (標準接種年齢：3歳以上4歳未満) [1期追加]初回2回目終了後、6か月以上の間隔をあけて1回（標準的には1年を経過した時期） ※1期・2期とも上記の年齢で接種の機会がなかったH17.4.2～H19.4.1生まれの人は20歳未満まで、不足回数を接種することができますので健康推進課または指定医療機関にお問合わせください。												[2期]9歳以上13歳未満に1回											
	2種混合 (ジフテリア・破傷風)	計1回	11歳以上13歳未満に1回 ※小学校6年生を対象に予診票を送付しています。																							
	ヒトパピローマウイルス感染症 (子宮頸がん)	計3回	小学校6年生～高校1年生に相当する年齢の女子 (H21.4.2～H26.4.1の間に生まれた人が対象、標準的な接種期間：中学1年生)																							

定期予防接種の対象疾病